

قال الشيخ الاعذرية الحامضة لا توافق المصدة وعين الاماكان
بسبب المعدة وكان ذلك الغذاء مما يدب المعدة ويقويه ويمنع
انصباب المراد اليه وقد كان فيما سلف عني عن التعرض للنضج
وانما امر بعلاج الالتم المقترن لانه يزيد في الصداق واقل انه يورث
السرور وهو مصدق وانما امر بترك المرخيات والادهان عند وجود
الترقلاهما لتزيد هاد ويدخل في ترك الحركات والجماع والفكر
وغوهم وهما اشده ما يمنع في الصداق وذلك الاطراف ووضعها في الماء
الحار اختبلا لجذب المادة من الراس ومنه شدة الاطراف والرعادة
هي السمكة الحذرة التي يدكر الناس ان الصايد يتخذ ربه اذاه
وقعت في شبكته والقنسية المتخذة من جلدها تسكن
الصداق بسبب التخدير لمبطل الاحساس الصداق لكن قال
جاينوس جريت ما قيل من تسكينها الصداق بوضعها على
الرأس فيصبح قال المؤلف علاج الصداق الحار الاشربة شراب
الاجاص او المهنددي والليمون ايها كان مع شراب اللينوفراو
البنفسج او نقيع حاض او حلو بسكر او شراب نيلوفر وبنفسج
او بزرقطونا شراب اجاص او شراب حاض ونيلوفر او مهنددي
الاعذرية مروية حب الرمان واجاص او مهنددي الاسفناح
او بقل او خبازي او بقله يمانية اما سادجا او محض ماء
الليمون والحصرم وقد تستعمل هذه مع الفراسخ والحملجدي
او الصبان عند عدم الحصى او خوف الضعف الادوية الموصفة
برود ما ورد وصندل او شاة صيني بخل او بغيره ان كان
سهر

سهر يستعمل بخرقه كتان ضماد شهيد وزهر بنفسج مدفوفين
معوين بلعاب بزرقطونا او جاء ورد وزهر بنفسج مدفوفين
للتخدير وزهر ما قوي بزهر البنفسج بلعاب من الايون مع مصالحة
وهو قيل زعفران ولطح الجبهة بالاقراص المشددة المعولة بما الورد
مسكن منوم نطول زهر نيلوفر بنفسج وخبازي وفترا الخشخاش
مقتش يطبخ وينطل بمائه ويكب على بخاره ويضمد بتغله المشتمات
ماء الورد والخلاف والنيلوفر بخل وان كان هناك سهر فهذه مع
دهن بنفسج او نيلوفر او دهن احسن وزهر ما قوي بشمه من
الايون مصالحة بالزعفران وزهر اللينوفر والبنفسج والخبازي
وماوه واوراق الخلاف وزهره ويرش البيت ويكثر في الحارات
ويجلس بقرب المياه وشم الكافور للصداق الدموي بالغ اقول
المراد بالصداق الحار ما كان منه سادجا وكذا البارد والرطب
واليباس على ما ذكره عقيب هذا الكلام على الترتيب لانه صرح
في علاج المادي بهذه التدبيرات مع التنقية وما ذكره من
الاشربة جيدة واجودها شراب البنفسج واللينوفر ما يفهما
من التلطيف والتنقيح وجماع الحوامض من المنافذة المذكورة
للصداق وطب الاجاج من ارجاء المعدة وفيه نوع ضرر بالدماغ
المشاركة وهذا الكلام فيما ذكره من الاعذرية والمؤلف لم
يفصل الامرية الاشربة والاعذرية ثقة على اختيار الطبيب
والادوية الموصفة يجب استعمالها في مقدم الدماغ قريب اليافوخ
حيث الدور الاكليني يتوقع نفوذ ما ينغذ ومؤخر الدماغ عظم