ذلك يحزنهم حزنا شديدا او يكون
سببا في حصول النشنج والاهتزاز
فينشأ عن ذلك ضررا كثيرا اكبر.
فينبغي اذا لم يقبل الطفل الدواء —
يستعوض بالوضعيات الظاهرة او
الحمية او الغذية او يعطى لامه او مرضعته
ان كان لبنها مغذيا قويا كان كان
قديما ليتغير بلبن ضعيف التغذية
وان كان لبنها جديدا غير مغذ تغير
بلبن قديم. واعلم ان الادوية التي
تستعمل لامراض الاطفال قليلة
بالنسبة للتي تستعمل في
امراض الكبار سواء كان ذلك
للسبب المذكور او لطاقة اعضاء
الطفل لكونها لا تحتمل الادوية —

القوية

القوية كالكبار لكن اعظم ما يعالجون
به الحمية لان اغلب امراضهم تكون
في اعضاء البطن وحينئذ فمن المهم
ان تعرف الامهات والمراضع ذلك وان
تترك كثرة الارضاع والتغذية
كلما صاح الطفل لانها عادة مضرة
وهن يظنن ان كثرة الارضاع والتغذية
انفع الاشياء للطفل وهو ظن قبيح
الخطاء [illegible]
واعلم انه يندرج في هذا السن مدة الرضاع
والفطام والسنتين الاول والثاني والترعرع
وغالب هذه المدة سبع سنين وهو

المبحث الثاني في الرضاعة

الرضاعة تنقسم الى رضاعة

Copyright © King Saud University

Created with PDFsharp 1.2.1269-g (www.pdfsharp.com)