

ذلك يوضع على بطا او عصير  
 نظيف ليتحرك ~~عكس~~ الحركة  
 كذا:  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$   
 و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$   
 و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{2}$   
 اعلم انه يجب ان يوضع الطفل  
 على صفرة في الفراش مقابل  
 للضوء لان الضوء ان كان من جهة  
 اخرى اجترهد الطفل في النظر الى  
 تلك فينسبب عن ذلك الجول في  
 الغالب كما يجب ان لا يوضع في  
 حر الهواء : وان يكون  
 المحل معتدل الحرارة والهواء وان  
 يعود على البول والغايط في  
 قصرية

قصرية ونحوها في اوقات معلومة  
 بقدر الامكان فتي تعود على  
 ذلك سهل عليه وسلم من  
 الفذر والوساخة لانها سبب  
 لما يعتريه من الامراض : ومن  
 حيث ان الطفل الصغير سريع  
 الغضب كثير الخوف والحركة  
 وينثر بصره من ادنى ضوء ينبغي  
 ان يعود على الجسبان يقرب مما  
 يخافه بالله سبحانه ليكون  
 جسور الديرهاب شيئا ولا يمشك  
 به في الظلمة مدة طويلة لينعود  
 على الضول كما ينبغي ان  
 يحذر من الاشياء المضرة كالماء