

واولها اوسيفكسيا  
 قد يعرف الاطفال المولودين  
 جديداً واداء الايفكسيا اي  
 الاختناق وذلك في وقت  
 الولادة لان المولود جديداً قد  
 يختنق حال نزوله من بطن  
 امه فيصير باهت اللون او  
 بنفسجيه ويصير لجه مرتجيا  
 واطرافه مسترخية ويعسر  
 تمييز نباضات قلبه وكذا نباضات  
 الحبل السري ومتى حصل ذلك  
 لهفل ينبغي ان يوضعه على  
 جانبيه بشرط ان يكون مرتفع  
 الرأس موجهاً وجهه الى  
 اليمين

وينظي جسمه وينظف فيه وانفه  
 من المادة المخاطية لانها تمنع نفوذ  
 الهواء والملك الهوائية ثم يدلك  
 بالوسيلة الاطرف بكيس  
 من صوف ناعم فان لم تنفع الوسيلة  
 يطر المزلوله بوضع اليه ابطينه في الماء  
 الفاتر ويدلك جسمه ايضا والشفاء  
 على الله ورودد

نحو

تاثيرها السكته  
 اعلم ان السكته تشبه الاختناق السابق  
 الا انها تتميز عنه باثني عشر  
 يكون وجه الطفل اسمر غزالياً وصدك  
 تحتيا واما جلده محتقنا وصيدزمتي  
 ظهره تطلع عليه هذه الاعراض