

الحالة يكون بفصل اللسان عن اللثة
 بواسطة شقها بعشرط ذى زرا
 او بمقص رفيع ذى زرا ايضا ويلزم
 فعل ذلك سريعاً لتسكل الرضاعة
 على الطفل ولا يهلك وينبغي لام
 الولد او مرضعته ان تدخل اصبعها
 بعد كل قليل من الزمن في محل الشق
 ليلا يلحم ثانياً فان حصل من ذلك
 نزيف ينبغي ان يكرى بالحديد المحمى
 و٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٣ و٦٤ و٦٥ و٦٦
 اعلم ان لسان الطفل ان كان قصيراً
 يتمكن من الرضاعة كما ينبغي كما انه
 ان كان طويلاً جداً لا يتمكن من
 تحركه ولا من امتصاص الحامه

٦٥

كما ينبغي ايضا ولا يتمكن من ذلك
 جيداً الا اذا كان متوسطاً لانه
 يجره كيف شاء ولذلك
 ينبغي ان كان قصيراً ان يفصل
 قيده بمقص لكن مع الاحتراس
 فان حصل من ذلك نزيف
 بسبب قطع الاوعية التي تحت
 اللسان ينبغي كيرها بالحديد المحمى
 و٦٧ و٦٨ و٦٩ و٧٠ و٧١ و٧٢ و٧٣
 قد تلغم اجفان الطفل المولود مع
 بعضها لكن اولئحام اما ان يكون
 نافصاً اعنى في جزء منها او يكون
 كاملاً فكل منهما اما ان يكون