

شفتها تنفيا وانسب الوقات  
 لعلاية علاج ذلك هو الوقت  
 الذي تكون النسبة الكسبت  
 فيه قوة لتعمل بها غرز البرص  
 والخيطة وهو سن اربع سنين او  
 خمس الا اذا كانت العلة  
 او الفلحة تعيق رضاعة الطفل  
 فيلزم المبادرة لعملها عقب الولادة  
 في الحال وان جعل عدم التشوه  
 ينبغي ان يبعد ما يكون معظم الشق  
 وان تدمى هو فيه ليسرع النجاشها  
 وان يخاط خياطة لفية في وقتها  
 والثلاث عشرها الاورام التي تحدث  
 في روس الاطفال المولودين حديثا  
 غالب الاطفال المولودين حديثا  
 بهد

يشاهد في رؤسها ورم عاده  
 ان يشغل مؤخر الرأس وغالب  
 حصول هذا الورم يكون من  
 الضغط بسبب كثر اللقاة وقت  
 مروره من الحوض وهذا الورم  
 يكون منكونا من وصل او من دم  
 والنسيج الخاوي الذي يكون  
 مغطيا له يكون من تشبها والجلد  
 مختفا مختفا عنقنا بفروث  
 وهو الذي كان يسمى بالكرم  
 ولون الورم يكون مصفرا وفيه شقوق  
 اذرتا او سودا وذلك على حسب  
 مقدار الدم الموجود في الورم فان لم يكن  
 الا في النسيج الخاوي لا يحصل عنه الاعراض

ممكن  
 +

