

وإنما خامس عشرها الزيف البصرى
 هذا الزيف يحصل من شح الكوعية
 السدرة التي تكون تحت النخلة
 ردياً من وداعة الربط لانه ان
 كان جيداً كان حصول الزيف
 المذكور نادراً وهذا الزيف قد
 يستمر مدة ان لم يقبه له ويعالج
 ولاجل منه توضع على السرة
 فادة اهرامية الشكل مثبته نقطة
 من مشمع ويربط عليها وتترك
 هكذا اسبوعاً او اسبوعين
 حدث ان الكوعية اذنى منها الزيف
 غائبة كما يمكن ربطها وان كان
 الزيف المذكور مما ذكرنا من الهذاه

الاول

ورابط الحبل السرى ينبغي ان
 يشد عليه جيداً او يربط برطبا
 غير الدول ويحكم فينقطع
 الزيف المذكور وينتهي
 هذا الالتهاب يحصل بعد الولادة
 بزمن قليل سواء ربط الحبل السرى
 او لم يربط ويحصل من طرفه المفضل
 بالبطن التهاب يسقط منه الحبل
 المذكور ويخلفه قرحة صغيرة
 تنقيح وتبرأ بعد قليل من الزمن
 وعلى كل فهو التهاب خفيف
 لو يعالج او بالنظافة واحياناً
 ينقيح ويسيل منه قيح غزير وتطو

ل