

مدته بل قد يلزم ثم ينقرح ثانياً
 ومتى حصل ذلك ينبغي ان يعالج
 بنفسه مراراً بغلى ملين وبعده
 زوال الالتهاب يبدل المغلى اللين
 بالنبيد المعلى او العطرى او
 نوضع عليه رفادة مياولة بالليل
 المذكور لاجل سرعة الالتئام
 وبعدها عشرة اشهر
 هذا الداء يحصل للاطفال المتولدون
 حديثاً ان لم ينتبه لهم فيحصل
 لهم في الجملة العلياسن الدورية
 والالية والوركين احمرار ناشئ
 عن مكث المواز الثقيله والبول
 على هذه الاجزاء والاحمرار المذكور

بشفاً

ينشأ عنه اكلون فلا ينهنا
 الطفل بالنوم ويكون محل الثنية
 بجهاً بدل ان يكون متقرحاً
 وينفخ منه سائل غزير مبيض
 غروي كرية الريجة وهذا ما مثل
 لما يحصل لمن كان سمياً فانه
 يحصل له في محل الثنية كذلك
 حيث ان المحل المذكور لم يكن
 معرضاً للهواء
 يعالج النسييط المذكور بتنظيف
 الطفل وغسل المحل المسمط
 بغلى ملين ثم زر مسكوق مجفف
 كالطين الناعم او غيره عليه