

هذا الدأ هو تريح حاصل في الفشاء  
 التمامي واظم اسبابه برودة  
 الرأس والجسد كله او اطراف  
 السفلى ومتى اصاب به الطفل  
 الصغير لا يقدر على الرضاعة لانه متى  
 امتص الثدي يضيق نفسه ويظهر  
 وجهه احمر بنضج الانسداد  
 خياشيمه فيركه في الحال ولازمه  
 لا يحصل له من ذلك سعال  
 غزير فيصيح لذلك صياحا عاليا  
 فظن من لا خبرة له ان هناك  
 عائقا يمنع عن الرضاعة: وان  
 حصل للطفل ورم في انفه او في  
 جفنيه السفليين بقى فيه مفتوحا

ويمنه

وعينه حمر او ثين رطبين ويكثر  
 عطاسه ونفقد شهينته وتسيل  
 من خياشيمه مادة مخاطية غزيرة  
 تصير ~~صغيرة~~ نكسون في اول الامر شفافة ثم  
 وتعتريه حمى ثم تنقطع المادة المخاطية  
 ونزول الحمى: وفي هذه الحالة ينبغي  
 ان نفسل خياشيمه بمغلى ملين لنزول  
 منها المادة المذكورة السادة لها في  
 المادة يعزى الطفل بالمعلقة وينظر  
 خمسة ايام او سنة حتى تزول تلك  
 الحالة ويمكنه الرضاعة: وان كانت  
 الخفيفة تخفيفه او طارئة عن قرب  
 يكفي في زوالها الندفية: وان