

١٠٤
او عقب النوم: وفي مثل هذه الحالة
يكفي في انقطاعه تقليل مقدار
الغذاء او الرضاعة: وقد يكون سببه
تهيئا في قناة الهضم ناشيا من
بعض الجواهر التي من انطبيخها ان
تصلح القناة المذكورة حينئذ ينظر
فان كان في راحة المواد المنقائية
او راحة في الطفل حموضة ينبغي
ان يعطى ثمان قحبات او عشر من
المغيسيا المكسبات او الراوند وان
كان الطفل من ينفذ من الفطير
او اللحم الدسم فانه يكون عرضة
للقيء المذكور فينبغي ان يستقي منقوع
الشاي فيبدل غذاءه بشي آخر:

فان كان

١٠٥
فان كان سببه زيادة احساس
المعدة ينبغي ان يعالج بالادوية المروية
ويوضع على قسم معدته لصقة تيراقية:
وفي بعض التسنين الصعب يحصل
للطفل قي غير يكون منسببا من
تهيج اللثة ومتى كان كذلك
توضع خلف اذنيه علقان لينزل
التهيج المذكور وان كان
معه اسهال ينزل بذلك ايضا:
وان سببه تهيج مديا
يوضع في اذن فاترو وتوضع المكاد
المليئة وبعض العلق على قسم
المعدة ففي الغالب ينزل القي بذلك:
وان كان سببه ارتداد اعلا جلد يوضع