

في عام فانه يريدك جسمه ويوضع  
 في الفراش فان لم يفتح في الحال  
 التي بذلك فوضع على قسم المعده  
 منقطه : وان كان سببه رايحه الفم  
 ينبغي ان يعرض للهواء النقي ويشق  
 بالخل بالليل والنوشادر السائل ، وان كان  
 سببه تامل ولطعام كان في اثناء من  
 نحاس مكثر ينبغي ان يمشي اللبن و  
 زلال البيض المخفوق بالماء ، وان  
 كان سببه اليرقان بالامعاء يعالج  
 بالادوية المخرجه لها والله الشافي  
 (الموفي ناديين الرهزال والخافه) ونظرة  
 قد يحرس للطفل بعد الولادة هذال <sup>مدة</sup> وعلاجه  
 حتى يتعجب اهله من خافته وسببه  
 ذلك ان الطفل يولد مشقق الضيق  
 الخلوو

الخلوي فقمه يكون ظاهريا فقط وحينئذ ينبغي ان  
 تعلم الام بذلك لانها تحشى على ولدها  
 فتمتن ومنع ذلك فخافه الطفل المزبور  
 لا تدر صفة الطفل  
 (الحادي والثلاثون تيسس النسيج)  
 (الخلوي)  
 قد يشد تيسس النسيج الخلوي في الجنين  
 وهو في بطن امه وقد يحصل من  
 اول يوم بعد الولادة الى اليوم الثالث  
 ويندمان يجهل بعد الاسبوعين الاولين  
 واكثر من يصاب به الاطفال الضعاف  
 او المولودين قبل تمام اشهر الحمل ومن  
 علامات عدم الرضاغة والفتور وبرد  
 الاجزاء المصابه ، ويند ابالاطراف  
 السفلى ثم العليا وفي الغالب  
 يصيب الخرد وانما سار سريعا  
 تحصل اليبوسم في النسيج الخلوي  
 الخلوو