

واسبابه استرخاء الغشاء الباطن
للمستقيم او الكسحال الذي
يكون في زمن الشغل او حصول
الدوسنطاريا او وجود الوريدان
في المعاء او الامساك الذي ينشأ
عنه زحير وقت التبرز او وجود
حصاة في المثانة فان كان السقوط
جديدا او الورم الناشئ عنه صغير
الحج يضغط على ما سقط منه بعد
تبركث الطفل وان ازمن وكبر
حجمه بقي خارجا مدة طويلة وحينئذ
يتزيد حجمه بالتأثرات الخارجية ويثخن
ويجرح عنق معنمه وتسيل منه مادة
مدرة او مصلية او صديدية
وهذا

وهذا الداء قد يصيب بالتهرب
شديدا او اخفنا في الورم او
مدونت مغرنة فيه فان كان
حادا تعان قرب يسكل مجموع
كاذ كزنا وهو ان يجمع
الطفل مستقيما على ظهره ويشني
فخيه وركبته على الحوض
ويكون صدره مرتفعا ثم يضغط
على الورم من اسفل الى اعلاه
بالاصبع اليسارية ملفوفة في
خزقة مضمخة بزيت او مرهم بسيط مدهونة
ويصعد به الى اعلاه داخل المستقيم
وان تعذر دخوله بمرنه الكيفية
يضغط عليه باليد الاخرى