

لأن ما يرضعه من اللبن لو يكفي
غالباً في علاج الداء المذكور
وأحسن ما عولج به هذا الداء
وحصل به الشفاء السليماني
المذكور في كفي للطفل منه جزء
من ٤٠ جزءاً من قحمة بشرط
أن يعطى مثل ذلك لمريضه
فإن خص الطفل دون من
ترضعه ينبغي أن يستعمل له جزء
من ٤٠ جزءاً من قحمة إن كان
عمره ستة أشهر ويأوم
على ذلك حتى يصل إلى ثلاث
سنين ثم يزداد المقدار تدريجاً
إلى نصف أونصة ثم إلى نصف
الأسدس

الأسدس ثم إلى الثمن: فإن
كان عمره ثلاث سنين فالمناسب
أن يعطى من قحمة القحمة إلى خمس
قحمة أو سدس وإن كان عمره خمس
سنين فالمناسب أن يعطى من
قحمة القحمة إلى سبع قحمة: وإن
كان الداء قديماً ينبغي أن يستعمل
بالاستحضارات الزبقية
وبالمفرقات ويسقى الغليل من
أوقيه إلى ثلاث أواق من
شراب العنبره وذلك
بحسب سنه: فإن كان
الدم هي المرضعه ينبغي أن تدوم
المعالجة مدة ستة أسابيع بخلاف