

لكن الاحوال ينقح فيها الرأس او
التي
لنحفظ غده ينبغي ان لو يستعمل
فيها الدهان المذكور ومن المعام
ان ارتداع القروح المنسب عن
القول فحاجة ينشأ عنه مره شديد
وصدغ واحيانا التهاب العين
تفاح لاذنين وبنو الحاجم والوربعون تقحح كوزنين
قد يحصل لبعض الاطفال المولودين
جدياً قروح في الكوزنين تسبب منها
مادة صديديه كثيفة ومتى حصلت
لا ينبغي ان تقطع فحاجة لونه ينشأ
عن ذلك اعراض خطيرة وقد
تستمر مدة وتكون عرضاً لمرض
آخر فان حصل ذلك ينبغي ان
تفسر

تفسر
اذناه من اكل يوم بالماء او يغلى
مابين وتوضع على القروح التي
تكون خاف الكوزنين ورقه سلق
مدهونة بزبد وقد تحصل لبعض
الاطفال اعراض آخر كالمره واحرقاً
القد وغير ذلك وفي مثل هذه
الحالة ينبغي ان توضع على ذراع
الطفل منقطة او على قفاه فان
انبعثت القروح نزلت الى
اسفل العنق يوضع مكدرات عليها
تكون قد غمست في لبن قد
غليت فيه رؤوس الخشخاش
وتوضع خلف اذنيه منقطة
فان كانت طبيعة القروح