

خطرة كمرض الخ والخلق والصد  
والبطن وينتج من ذلك الشنج  
المعروف عند العامة بالقرينة  
بالحق القزينة او الاستسقاء  
فلاجل عدم الوقوع في شئ من  
ذلك ينبغي ابقاء الناقه في  
حاله مدة شهر او شهرين  
ولا يعرض لشدة الهواء ولا  
يعطى الاطعمت خفيفة كما  
تشورية التي لو دسم فيها اول  
يرجع لعادته في الماء كل والمشر  
الوزن ربحا و (الرابع والدرعون  
(الحواق المعروف بحرق الحما)  
(الجرى الطيل والجرى الكاوي)  
اعلم ان هذا المرض من انواع الجرب  
ايضا

ايضا حتى انه يلين به في بعض  
الاحيان لكن قد يعرف بادنى تأمل  
واعظم ميزله انه لو يعرض بالملوحة  
ولو بالتلقيح وان اعراضه اخف  
من اعراض الجرب الحقيقي  
وان كانت متشابهة لان تشوره  
كشوره الا انها لو تسير مثله لو نسرها  
تجف وتسقط في اليوم السادس او  
السابع ولو يبقى بعدها اثر التمام  
ومعالجته هي حمية المصاب اياما  
واعطائه شرابا محلا ومفظه  
من تغيرات الجو كالبرد وغيره بالملكث  
في منزله مدة ايام

١٣٢

انها