

العينين فيكون محور النظر
غير منتظم وينت عن اعنياد
الطفل في النظر اعنياد اريفا
لوهو او من حصول شنج في
احد عضل المقلة ولا جعل زاوية
الطفل وسلامه منه قبل حدوثه
ينبغي ان يوضع وهو صغير امام
الضوء او يجعل امام لعبة تلهيه
عنه والغالب في الحول ان تكون
اليسرى فان كان الحول غفيفا
لا يتعكر منه النظر بخلاف ما اذا
كان شديدا فانه يختلف الوجه
ون الطفل حينئذ يوجه العين
القوية النظر الى جهة الشيء
المنظور

ان تكون
الاحرى العينين الضعيف
في الاخرى كما ان الغالب

المنظور فتتبعها الاخرى بالضرورة:
ولا جعل اصلاح ذلك اذا حصل
ينبغي ان يجهد في احداث
التعادل بين العينين بان
تعود العين الضعيفة على
النظر وان يقلل الضوء على
العين القوية حتى ان الضعيفة
تقوى وتعاود لها ولا جعل تقو
ايضا ينبغي ان يتخير بعد كل
قليل بنحو مقو او يقطر فيها
قطور مقو ايضا وقد يعالج
هذا الداء بحملة اشياء منها
ان يجعل على العينين عينا
من الزجاج فظلمتا ليد فيهما فتقوى

ينها