

١٦٨  
علي وجود الديدان في الطفل  
النهوع والنخشي وسيلان  
اللغاب لكن ينقطع بعد الركن  
وحينئذ لا ينضم ما يأكله من  
الطعام كعادته ويكون لسانه  
احمر الطرف ابيض الحوافي  
والظفر والقاعدة وتفقد شهوته  
او تزيد ويعتريه عطش شديد  
ومفصص ويحس بنخس  
بطنه وانتفاخ ويعتريه زحير  
والكلان شديد في مقعدته ويصير  
بوله مرايقا ويندر ان يكون  
ننأ وقد يعتريه امكسا واسهال  
ومادته مسايله

فيكون فيها الطرف المستند  
وتعرض من جهة الذنب ولها  
يكون مستديرا اوفيه رائحة  
مرنة وامر مع مصاصتا وفيه من  
الجانبين مسم بين القدر  
الملاودة اصعب انواع الديدان  
واكثر من يصيب بها الكحول  
والاطفال بخلاف النوعين  
المتوسطين فاكثرت من يصاب  
بهما الاطفال  
ويوجد نوع آخر يعرف بالديدان  
الحوصلية ولا تنفرض  
له لونه لا يوجد الا في الاضراس  
المنفيرة من البدن والعلامة

علي