

او بالارماى تقوى نفس طبقات العين **الباب**  
**الخامس** في البرد وعلاجه اما البرد فتوخ واحد  
واما سببه فاجتماع رطوبات غليظة تجمد في الجفن  
واكثر ما يتولد في ظاهر الجفن **علامته** انه ورم صلب  
شديد شبيه بالبرد **العلاج** ينبغي ان يذاب الاشق  
او القندة بالخل الثقيف ويطلى عليه وقد يخلط ذلك  
مع دهن ورد وصمغ البطم وشمع او ينقع سكينج  
بخل ويطلى بهذا المخل فان نافع من البرد والشعيرة  
يؤخذ كندر درهم مر درهم لادن ربع درهم شمع نصف  
درهم شب وبورق ارمنى من كل واحد ربع درهم  
يجمع بكم دهن السوسن او بكم الرنت العتيق  
ويطلى فانه يحلل والا فينبغي ان يشق الجفن بيض  
شقا بالعرض ثم تخرج البردة بملقعة الميل فان كان  
الشق عظيما عميقا مسترخي الشفتين اجعهما  
بجياطة في الوسط ورد عليه درورا اصفر فان  
كان المرض في باطن الجفن فينبغي ان يقلب الجفن  
ويشق بالعرض من داخل وتخرج البردة ثم تاسر  
بفصل العين بام حار **الباب السادس** في الحجج  
وعلاجه اما الحجج فتوخ واحد وتعرض من فضلة

غليظة

غليظة سوداوية تنصب الى الجفن وتجمد فيه  
وتحجج **علامته** انه ورم صغير شبيه بالغدد الصغار  
صلب والسبب في صلابته رخاوة الجلد وسخافته  
لانه يحلل لطيف المادة ويحجج غلظها فيصل مثل ما يعرض  
في العنق وتحت الابط والاربيتين والحنا زير والاورام  
الصلبة ويسمى هذا المرض ورم العدسة ويعرض ذلك  
من شبتين اما من كثرة الاطعمة الغليظة اما من  
امتناع تحلل البخارات **العلاج** يبتدى اولا بالقصد  
من القيح من جانب المرض وينظ بام حار في ابتدا  
فان تحلل والا فيجب ان تضع عليه مرهم الدبا خيلون  
فانه يندده فان لم يتبدد فالرمد بالمرهم لينضم ويجمع  
**فاما** اذا تمارى الامر فاقلب الجفن وافتح الموضع بالمبضع  
ويكون المبضع مدور الراس بالعرض وعمق الفتح  
واحد ان تحرق الجفن واعصره بطرفك او بحلقة  
الحاتم فانه يخرج من الموضع شئ شبيه بما يخرج  
من فصية الريبة وربما كان مدة فان خفت ان  
بعاد والمريض فخذ تسفي الجرح براس القراض ليبطي  
الحامه وتجب المواد منه ودواوه بعد ذلك بالتطول  
بالماء الحار ولا يجب ان يفتح هذا الموضع حتى يجف ويعين