على الاستدارة بعد ان يوضع اولا من اسفل دباما على الاستقامة ثم يربط اجبرا ط في الرباط بعضه ببعض
فانها تمنع الرباطات المستديرة من ان تحل **الباب الواحد وتسعون في جبر كسر الاضلاع** اما اضلاع
الصدر فانه قد يعرض فيها الشق في جميع اجزائها واما اضلاع الخلف فان الشق انما يعرض لها مما يلي
القفار اذا كانت من هذه المواضع غطا ميرلها عرض واطرافها غضروفية رقيقة وكذلك صار يعرض لها
الكسر والرض من قدام وهو يعرف لك عند المسك الموضع وتفتيشك اياه بالاصابع فانك تجد في الموضع
خشونة وتحس به غير مستوى وان كان العظم قد انكسر فانك تسمع خشخشة فان كان الكسر مما يلي الى داخل فان
العليل يعرض له وجع شديد ونخس اشد من الوجع والنخس الذي يجده صاحب ذلك الجنب ويعرض له مع
ذلك ضيق نفس وسعال ونفث دم كثير وانت قادر ان تسوي ما تجده في الاضلاع من الاختلاف وتجمعها
الا انه يمكنك ان ترد الاضلاع المائلة الى داخل بيدك وقد ذكر بعض الناس انه ينبغي ان يطلى العليل غذاء
كثيرا ويكون مما يولد النفخ والرياح اذا امتلأت المعدة والامعاء بالغذاء والرياح اندفعت الاضلاع الى
خارج وهذا عمل غير موافق لانه ليس مما يلي الصدر والمعدة مشاركة في هذا الموضع ومع ذلك فان الامتلاء
يهيج الورم ويزيد فيه ومن الناس من يضع على الموضع محاجم وهذا اشبه بالصواب الا انه يخاف
من ان يجتذب الى الموضع مادة اعني الى العضل الذي على الاضلاع والذي فيما بينها فيحدث ورما ويزيد في
انصداع الاضلاع الى داخل فاما بعض الاطبا فانه امر ان يوضع على الموضع صوف قد غمس في دهن حار ويوضع
رفايد فيما بين الاضلاع حتى يميل ويكون الرباط مستويا الذي الف على استدارة كما ذكرنا في الصدر وان عرض
نخس شديد ووجع تعلق العليل بسبب عظم ينخس الحجاب فينبغي ان يشق الجلد ويكشف عن الضلع المكسور
ثم يصير تحته الالة التي يحفظ الصفاق وتقطع العظام والشظايا التي تنخس برفق وتخرجها ويعالج
الموضع بما ينبت اللحم ويدمل ان لم يعرض ورم حار فان عرض الورم الحار فضع عليه رفايد مغموسة
في دهن ناتر ويعالج الموضع بما يزيل الورم الحار ويدبر العليل بما ينبغي ان يدبر مثله ويضطجع على الجانب
الذي يخف عليه **الباب الثاني وتسعون في جبر كسر الورك وعظم العانة** ان عظم الورك والحاضن
قلما يعرض لها الكسر ومتى عرض لها الكسر فهو كالذي يعرض للمنكبين وذلك ان عظامها يرضض وينشق
بالطول ويميل الى داخل مع وجع شديد يمتد الى الساق وعلاج ذلك يكون كعلاج جبر المنكب فيه الا ان
هذا لا يمكن ان يخرج منه العظام التي رضضت بالشق بل يسيرا بالاصابع من خارج ويكون باقي العلاج
مثل علاج المنكب ويستعمل الترطيبات ويصير رفايد في الموضع المقعر من الحاضرة حتى تملأه لما يكون
الرباط مستويا على استدارة وكذلك ايضا يجبر عظام العانة بان تشق الاصابع وتربط وهذا العظم قلما

يعرض له الكسر

يعرض له الكسر **الباب الثالث وتسعون في جبر العظام الكاهل والفقار وشوكها** ان الفقار ليس يكاد يعرض
لها الكسر لكن يعرض الرض لها ويتبع ذلك انضغاط النخاع فاذا كان معه افتراق العصب بالمشاركة وكثير
ما يعرض من ذلك الموت سيما ان عرض ذلك الفقار الرقبة فمتى عرض شيء من ذلك ورايت علامات الهلاك
فلا تعرض لعلاجه وان لم تكن علامات الهلاك وامكنك ان تشق الموضع وتستخرج العظم المرضوضة
فافعل وان عرض للموضع ورم فينبغي ان يداوى ذلك بما يسكن الورم الحار من التنطيل بالدهن والملا
القاتم بالاضمدة من بعد ذلك وان عرض الكسر لشوك الفقار فينبغي ان يشق الموضع ويستخرج ما انكسر
من الشوك ويخيط ما انشقت وتعالجه بعلاج القروح فان انكسر عظم الكاهل فيدخل الاصبع السبابة في
المقعدة ويرد العظم الى خارج ويسوى باليد الاخرى من خارج ويرده الى الحالة الطبيعية وان حست
بعظم قد تبرى فينبغي ان يشق عن الموضع ويستخرج العظم ويرد الشق بالخياطة ثم يستعمل الرباط
الذي يعرف باللجام وبما يصلح ان يربط الموضع وانت تعرف ما يعرض بهذه العظام من الرض والكسر
بالمس والتفتيش بسهولة فان ان يخفى عليك شيء من ذلك **الباب الرابع وتسعون في جبر كسر العضد**
اذا انكسر العضد فينبغي ان يستعمل في علاجه المد من فوق واسفل ويكون مدا معتدلا فان الكسر
قريبا من المرفق فينبغي ان يمد المرفق الى اسفل والعضد من فوق الكسر الى فوق ثم ترد العظام المكسورة
الى حفظها ولولفها حتى تستوي وتتهندم ثم يستعمل رفايد اعراض وتطليها بدواء الجبر وتلزمها
موضع الكسر كما يدور ثم يضع الجبائر حول الكسر كما وصفنا وتربطها بعصائب وتربطا جيدا ولا يكون
شديدا يولم العضو ويجذب البهماة لا رحوا دو احذر ان يحمل الجبائر على مفصل المنكب او مفصل
المرفق فانه مما يضر بالمفصل وبالعصب ويجذب اليها مادة فيحدث لذلك ورم ثم يشد العضد
برباط الى صدر العليل والى ناحية كتفه ويحتبس من الجانب المخالف الكسر وينبغي ان تترك ذلك الى اليوم
الثالث ثم يحل ويعيد عليه الضماد والرفايد والجبائر والرباط كما فعلت في الكرة الاولى وينبغي ان تنظر
وتتفقد فان كان الرباط قد استرخى والتوى او مال شيء من المفصل الذي شدته عليه قبل اليوم الثالث
يحل ويعاد كالذي كان وان عرض للعضد ورم فينبغي الا يشد بالجبائر ويربط بالرفايد المطلية
بالضماد ويكون الشد رقيقا ينطل على العضو وهنا مفترا ويطلى حواليه بالورد والصندلين وماء
الهندبا والكزبرة ويمنع انصباب المادة حتى اذا انحل الورم وزال فينبغي ان يستعمل الشد والرباط
الذي ذكرناه ويمنع العليل من تحريك يده الى ان يبرى العضد وتأمره ان يستلقي على فراشه وان
يضع يده على بطنه وهي مربوطة الى الصدر كما ذكرنا ويكون تحت عضده مخدة لينة ويحل الرباط

Created with PDFsharp 1.2.1269-g (www.pdfsharp.com)