ذلك الكوكب في الدليل هناك مثاله كوكب في احدى عشرة
درجة وثلثي درجة من الثور يعطي من هذه الدرجات في الدقايق
عشر درجات لاربعة بروج الثور والجوزا والسرطان والاسد
وبقي درجة وثلث درجة فيعطي لدرجة اثني عشرة درجة
وللثلثين ثماني درجات ويكون الجميع عشرين درجة فيكون
موضع اثنا عشرية ذلك الكوكب في عشرين درجة من
السنبلة وعلى هذا القياس اقول قد جمع في هذا الفصل حظوظ
اربعة هي الوجه والدريجان والنهبهر والاثنا عشرية
لاشتراكهما في انقسام كل واحد من البروج الى كل واحد منهما
على ان الحمل في كل واحد منها يبدا بتقسيمه ويعطى القسم
الاول لصاحبه والوجه والدريجان مشتركان في الكمية
ويختلفان في الارباب والنهبهر والاثنا عشرية يختلفان
في الكمية ويشتركان في الارباب وذلك لان كل برج اذا قسم
الى ثلاثة اقسام يسمى كل ثلث وجها ودريجانا وارباب
الوجوه بحسب ترتيب نضد الافلاك وارباب الدريجانات بحسب
ترتيب بروج المثلثات فوجب في الحمل ان يكون المريخ رب
وجهه ودريجانه الاولين لانه صاحبه وان يكون الشمس رب

وجهه

بهمن ازد بهشت شهريور اسفندار مذ خرداد مرداد
دساذار آذر بابان خور تير جوش ديبهمن مهر
... فرور دين بهران رام باد ديبدين دين
اراد اشتاد اسمان رامياد مار اسفند انيران وتسمى
الايام المسترقة بهذه الاسما اهنود اشنود اسفند مذ
وهشت هشتويش **الفصل السادس** في تاريخ الملكي وضع
في عهد سلطان جلال الدولة ملك شاه تاريخ اسما شهوره
هي اسماء شهور الفرس وعدد ايامها ثلثون ثلثون ويزاد
في آخر اسفندارماه الخمسة المسترقة وفي كل اربع او
خمس سنين يزاد في آخر الخمسة يوم للكبيسة ويكون اول
يوم من فروردين ماه هو اول يوم يكون في انتصاف نهاره
بلوغ الشمس في الحمل وبعضهم يجعلون اول السنة واول
الشهور ... الايام التي ينتقل فيها او في الليلة المتقدمة
عليها الشمس الى الحمل والى سائر البروج الاثني عشر وتقيد
شهور هذا التاريخ بالجلالي اشتباهها بالملكي ومبدا هذا
التاريخ من الكبيسة الملكشاهية وايام الجمعا مع هذه
التواريخ الاربعة يوضع في التقاويم في خمسة جداول

Copyright © King Saud University

Created with PDFsharp 1.2.1269-g (www.pdfsharp.com)