

واشتداد الوجع عند الحركة والجوع والذي يشترك من هذه
يعرف بتقدم ضررها كالغثيان وقلة الشهوة ومضاد
هضم او ضعفه او بطلانه ويبتدى من اليافوخ وربما
مال الي الوسط ثم تنزل الي القفا وتحلف حالة على الاكل
والجوع والصفراوي يشتد على الجوع مع عطش ومرارة
ثم والبلغى على الاكل وبعد قليل مع كثرة ريق وقلة
عطش وربما سكن الاكل الصداغ المعوى وان كان عن
بلغ لمرنة الاخرجة حاسبا اياها عن الدماغ والذي
عن الكبد ميل الي اليمين والذي عن الطحال الي اليسار
والذي عن الكلى الي الحلف والذي عن المراق الي القدم
والذي عن الرجم يكون في حاق اليافوخ وبعد ولان

اوران

او اسقاط او احتباس حيض وبالجملة لابد من تقدم
الضرر في العضو الاصلو الذي عن الحيات يعرف بزيا
دته لنزها وبقا وسكونه لسكونها والذي عن الحيران
ما يورجه من تشوي براه خلاط وينزل بزواله ويكون
في وقت **العلاج** ان تذكر اذوية لكل مرض فلنختارها
الحلوة عند اقتران السعال والميلنة للطبيعه عند آ
عقالتها وحيث اوجينا الاستنزاع فاعا نزيد بعد
النصح وتفتيح المجارى وتلين الطبع وبالجملة تسهيل
الطرف على القافون المذكور في الفن الاول
واذا اقترن مع الصداغ الم في عضو فلنبتدى بعلاجه
فان وجهه يزيد في الصداغ وان اقترن به نزلة تزكت