

السدة والورم عند اطرافها من جهة الامعاء لا يصل
 اليها ما يتصلها اولاً فتفتح عرق في الكبد او انشقاق
 او قطعة او قطع في جرم الكبد عن صربه او سقطه ويخرج
 بتقدم ذلك او خلط حار اذا كان يخرج الدم مع الزهاب
 وحده وقوة عطش او يكون الاسعال الكبدية لما ذكره
 فاسن يخرجها الي الدفع وتعرف ذلك وتخرج تلك المانة
 ما يخرج مع الاسعال من صديد او قيح او صفرا او خلط
 محترق وربما ادي الي خروج قطع من جرم الحية
 لانه ذوب بالنار واما من الامعاء فما كان من سحج فسيب
 اما خلط جازم والصفرا فتخرج في اسبوعين وربما
 بلغت القرحة الي ان تنقب الامعاء ويخرج الثقل الي

بعض وربما بلغ ذلك الي ان يجتمع الثقل في بطنه حتى كان مستق
 ثيموت وفي الاماكن التي تقدم ذكر الموت واسم القرحة
 ما كان في الامعاء الغلاظ وارجاها ما كان في الصا
 لكثرة عرقه وقربه من الكبد وكثرة انصباب المزة
 اليه والسودا فتخرج في اربعين يوماً وهو قاتل ولا
 سهال السوادوي الذي يعلى على الارض قاتل اذا وقع
 ابتداء حتى في حال الصحة والبلغم المالح يقرب في شهر او ثلث
 يابس يخرج الامعاء ويعرف ان السحج في اي الامعاء موضع
 الوجع وقوته فان وجع الدقاق اشد من وجع الغلاظ
 ووجع الغلاظ اعمق ومن التشنج فان كانت رقيقة
 نوبت الاكثر من الدقاق وان كانت غليظة نوبت اياماً من

Copyright © King Saud University